

Exkursion Vaaler Moor 1.7.2006

inhaltlich verantwortlich und Fotos: Maria Labischinski

Teilnehmer: Frau Wegner (UNB) Renate Swoboda, Peter Beier,
Eggert Horst, Dagmar Süßmilch,
Barbara Wittorf, Günther Schulz, Maria Labischinski, Manfred Weiß

1. Hochmoorfläche, südl. des Krogs Dammes,

Ausgleichfläche, die entkusselt und vernässt wurde

- Andromeda polifolia - Rosmarinheide
- Drosera rotundifolia - Rundblättriger Sonnentau
- Empetrum nigrum - Gemeine Krähenbeere
- Erica tetralix - Glockenheide
- Eriophorum vaginatum - Scheidiges Wollgras
- Myrica gale - Gagel
- Oxycoccus palustris - Gemeine Moosbeere

Moose:

- Polytrichum strictum
- Spagnum fallax, Sp. rubellum

2. Hochmoorflächen, nördl. des Krogsdamms,

- Andromeda polifolia
- Carex nigra, Carex rostrata
- Calluna vulgaris
- Dactylorhiza maculata ssp.mac., ssp elodes - Geflecktes Knabenkraut
- Dryopteris carthusiana - Dorniger Wurmfarne
- Dryopteris cristata - Kamm-Wurmfarne
- Empetrum nigrum
- Erica tetralix
- Eriophorum angustifolium - Schmalblättr. Wollgras
- E. vaginatum - Scheidiges Wollgras
- Myrica gale
- Oxycoccus palustris
- Narthecium ossifragum - Beinbrech

Moose:

- Aulacomnium palustre
- Polytrichum strictum
- Spagnum fallax, Sp. fimbriatum, Sp. magellanicum, Sp. palustre,

3. Spülflächen, westl. des Leersbecker Damms,

- Calluna vulgaris
- Erica tetralix
- Drosera rotundifolia
- Lycopodiella inundata - Gemeiner Moorbärlapp
- Moose:
- Campylopus introflexus
- Polytrichum commune, P. juniperinum P. piliferum

4. Wiesen und Gräben:

<i>Carex paniculata</i> , <i>C. canescens</i> , <i>C. disticha</i> , <i>C. hirta</i>	
<i>Calamagrostis canescens</i>	- Sumpf-Reitgras
<i>Catabrosa aquatica</i>	- Quellgras
<i>Equisetum fluviatile</i>	- Teich-Schachtelhalm
<i>Glyceria maxima</i>	- Wasser- Schwaden
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> ,	- Strauß-Gilbweiderich
<i>Lysimachia vulgaris</i>	- Gewöhl. Gilbweiderich
<i>Peucedanum palustre</i>	- Sumpf-Haarstrang
<i>Potentilla erecta</i>	- Aufrechtes Fingerkraut
<i>Ranunculus acris</i>	- Scharfer Hahnenfuß
<i>Ranunculus sceleratus</i>	- Gift- Hahnenfuß
<i>Rhinanthus angustifolius</i>	- Großer Klappertopf
<i>Rumex hydrolapathum</i>	- Fluss- Ampfer
<i>Scrophularia nodosa</i>	- Knotige Braunwurz
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	- Wasser- Ehrenpreis
<i>Viola palustris</i>	- Sumpf- Veilchen

Ringelnatter-Haut

Insekten:

Hochmoor-Perlmutterfalter (*Boloria aquilonaris*), Raupe auf Moosbeere (SH RL 2)

Rostfarbiger Dickkopffalter (*Ochlodes faunis* syn. *venatus*)

Großes Ochsenauge (*Maniola jurtina*)

Zahnspinner (*Leucodonton bicoloria*), 17.6. Nachtfalter (lokal und meist selten in Moor- und Heidewäldern)

Sand- Spülfläche:

Sand-Laufkäfer (*Cicindela campestris*) (grün mit gelben Flecken) (selten aufgrund des Standortes)

Schmalbock (*Strangalia quadrifasciata*)



